



MINIGUIA DE MAR

Toni Llobet · Enric Ballesteros

Peces costeros

del mar Balear



◀ Caballito de mar ▼

Hippocampus guttulatus

Caracterizado por su hocico largo y por tener a menudo excrecencias filamentosas en la cabeza y en la parte superior del dorso, su coloración varía del marrón al amarillo.

CT *Cavallet de mar*

EN *Long-snouted Seahorse*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



◀ Caballito de mar

Hippocampus hippocampus

Como otras especies de la familia de los signátidos, los caballos de mar incuban los huevos en una bolsa situada en el vientre de los machos, de donde salen minúsculos caballitos idénticos a sus progenitores. Las hembras pasan los huevos a los machos durante el cortejo, cuando se entrelazan por las colas.

CT *Cavallet de mar camús*

EN *Short-snouted Seahorse*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



Aguja de mar, mula *Syngnathus acus* ▶

De hocico largo y una prominencia en la parte superior de la nuca, se disimula muy bien en praderas submarinas donde simula la hoja muerta de un alga, incluso en movimiento.

CT *Serpeto* EN *Greater Pipefish*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



hocico de extremo rectangular distintivo

Aguja mula, palito *Syngnathus typhle* ▲

Se caracteriza por su hocico aplanado lateralmente, casi tan ancho como el cuerpo. Habita los fondos cubiertos de posidonia, donde pasa desapercibido.

CT *Aguja mula* EN *Broad-nosed Pipefish*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



▲ Chafarrocas

Lepidogaster candollei

De color variable, tiene una banda blanca entre los ojos y la aleta dorsal no toca la caudal. Vive a más profundidad que el chafarrocas de ojos, bajo piedras o en grietas.

CT *Aixafa-roques* EN *Connemarra Clingfish*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



◀ Chafarrocas, chupados dentado

Apletodon dentatus

Minúsculo, vive bajo las piedras y los erizos de mar, también en las grietas de las rocas. La coloración es uniforme pero muy variable, desde marrón verdosa a anaranjada.

CT *Xucladit de cap petit* EN *Small-headed Clingfish*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



◀ Chafarrocas, chafarrocas ocelado *Lepidogaster lepidogaster*

De color variable, tiene el cuerpo lleno de manchas oscuras, a veces difíciles de ver, y la aleta dorsal toca la caudal. Vive en guijarros, a muy poca profundidad.

CT *Xucladit* EN *Shore Clingfish*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m




► Dentón *Dentex dentex*

Depredador voraz, recorre los promontorios rocosos sumergidos y los límites de las praderas. Los individuos de gran tamaño se concentran en aguas profundas.

CT *Déntol* EN *Dentex*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



franja dorada entre los ojos

manchas de color azul claro en los flancos

▼ Herrera

Lithognathus mormyrus

De hocico puntiagudo y mandíbula fuerte, forma bancos en zonas arenosas cercanas a las playas, donde remueven el fondo buscando gusanos y crustáceos.

CT *Mabre* EN *Striped Sea Bream*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



★★★



▲ Dorada

Sparus aurata

Se alimenta de moluscos, crustáceos y gusanos, tanto en fondos arenosos como rocosos. De gran calidad gastronómica, se producen masivamente en granjas.

CT *Orada* EN *Gilt-head Sea Bream*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



▲ Tordo, bodión verde

Labrus viridis

De coloración variable entre verde y naranja, siempre moteada, prefiere las praderas, donde se camufla entre las hojas para atacar las presas.

CT *Grivi* EN *Green Wrasse*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



▲ Merlo *Labrus merula*



De coloración variable entre el verdoso, el marrón claro y el azul oscuro (machos), vive en roquedales y en praderas. Es muy vulnerable a la pesca submarina y como el tordo los individuos de gran tamaño solo son abundantes en áreas marinas protegidas.

CT *Tord massot* EN *Brown Wrasse*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



★★★



▲ Galán

Xyrichthys novacula

Favorito de la pesca recreativa en Baleares, los galanes se concentran en fondos de arena y sebadales. Se zambulle en la arena al sentirse amenazado.

CT *Raor* EN *Pearly Razorfish/Cleaver Wrasse*

0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



▲ Peto *Symphodus tinca*

Como todos los lábridos, se desplaza y maniobra moviendo las aletas pectorales, más que la cola. Las hembras, menos coloreadas, nadan a menudo en grupo.

CT *Tord flassader* EN *Peacock Wrasse* 0 1 2 5 10 25 50 100 200 500 1000 m



★★★★