

FICHA TÉCNICA NAN SUPREME 3



Preparado lácteo infantil en polvo

Ingredientes:

Suero de **leche** en polvo, dextrinomaltosa, **lactosa**, aceites vegetales (girasol alto oleico, coco, nabina, girasol y de *Mortierella alpina* rico en ARA), proteínas hidrolizadas enzimáticamente* de suero de **leche**, sales minerales (fosfato cálcico, cloruro de magnesio, cloruro cálcico, cloruro de potasio, cloruro sódico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, yoduro potásico y seleniato sódico), 2'-fucosil-lactosa (2'-FL)(contiene **leche**), lacto-N-neotetraosa (LNnT)(contiene **leche**), aceite de **pescado** (DHA), vitaminas (C, B3, E, B5, A, B1, B6, B2, ácido fólico, D, K, B12 y biotina), L-fenilalanina, L-histidina, L-carnitina y fermentos lácticos [cultivos de *Lactobacillus reuteri* (DSM 17938**)].

* La enzima utilizada en el proceso no es de origen halal ni kosher.

*** Bajo licencia de BioGaia AB

Código nacional: 192884.9

Envase de 800 g

Análisis medio		por 100 g	por 100 ml
Valor energético	kJ	2054	283
	kcal	490	68
Grasas	g	22,5	3,1
de las cuales: saturadas	g	6,6	0,9
ac. linoleico	mg	3.280	453
ac. α-linolénico	mg	410	57
DHA	mg	43	5,9
ac. araquidónico	mg	43	5,9
Hidratos de carbono	g	60,6	8,4
de los cuales: azúcares	g	43,0	5,9
Fibra alimentaria	g	0,3	0,04
2'-FL	g	0,2	0,03
LNnT	g	0,1	0,01
Proteínas	g	11,0	1,5

Sal	g	0,513		0,071	
Vitamina A	µg ER	500	(125%)*	69	(17%)*
Vitamina D	µg	6,8	(97)*	0,9	(13%)*
Vitamina E	mg				
	α-ET	8,7	(174%)*	1,2	(24%)*
Vitamina K	µg	32	(263%)*	4,3	(36%)*
Vitamina C	mg	80	(178%)*	11,0	(24%)*
Tiamina (B1)	mg	0,47	(94%)*	0,06	(20%)*
Riboflavina (B2)	mg	1,10	(157%)*	0,2	(29%)*
Niacina (B3)	mg	3,9	(56%)*	0,5	(7%)*
Vitamina B ₆	mg	0,41	(59%)*	0,06	(14%)*
Ácido fólico	µg	92	(74%)*	12,7	(10%)*
Vitamina B ₁₂	µg	1,0	(125%)*	0,1	(13%)*
Biotina	µg	13	(130%)*	1,8	(18%)*
Ácido pantoténico (B5)	mg	2,8	(93%)*	0,4	(13%)*
Sodio	mg	205	(51%)*	28	(7%)*
Potasio	mg	500	(50%)*	69	(7%)*
Cloruro	mg	420	(84%)*	58	(12%)*
Calcio	mg	570	(104%)*	79	(14%)*
Fósforo	mg	370	(67%)*	51	(9%)*
Magnesio	mg	49	(61%)*	6,8	(9%)*
Hierro	mg	7,4	(92%)*	1,0	(13%)*
Zinc	mg	4,5	(90%)*	0,6	(12%)*
Cobre	mg	0,39	(78%)*	0,05	(1%)*
Manganeso	mg	0,07	(5%)*	0,01	(9%)*
Selenio	µg	13	(65%)*	1,8	(12%)*
Yodo	µg	70	(88%)*	9,7	
Colina	mg	55		7,6	
Inositol	mg	35		4,8	
Carnitina	mg	11		1,5	

*Valores de referencia del etiquetado nutricional para lactantes y niños de corta edad

Medida dosificadora: 4,6 g

100 ml = 13,8 g polvo + 90 ml de agua

Código de receta: JWHPB208

NOTA IMPORTANTE

La Organización Mundial de la Salud (OMS*) ha recomendado que se informe a las mujeres embarazadas y a las que acaban de dar a luz de los beneficios y de la superioridad de la lactancia al seno, sobre todo que la lactancia materna es el medio ideal de nutrir a su bebé y de protegerle contra las enfermedades.

Las madres deberían ser aconsejadas sobre la manera de prepararse a la lactancia al seno y a su mantenimiento, y sobre la importancia de una buena nutrición materna tanto durante el embarazo como después de dar a luz. Debería evitarse la introducción superflua de la alimentación parcial con biberón u otros alimentos y bebidas, debido a su efecto negativo sobre la lactancia. Asimismo, debería advertirse a las madres de la dificultad de desistirse después de haber decidido no iniciar o interrumpir la lactancia al seno.

Antes de utilizar una fórmula infantil, las madres deberían ser informadas de las consecuencias sociales y económicas de dicha decisión; por ejemplo, si el bebé está alimentado exclusivamente con biberón,

necesitará más de una lata (450 g) por semana; así pues, hay que tener en cuenta la situación familiar y económica.

Habría que recordar a las madres que la leche materna no sólo es el mejor alimento para bebés sino que también es el más económico. Si se decide utilizar una fórmula infantil, es importante darles las instrucciones necesarias para su correcta utilización y llamarles la atención sobre el hecho de que el bebé puede enfermar si no se hierva el agua, no esteriliza el biberón o no se reconstituye el producto correctamente.

* Ver: Código internacional sobre la comercialización de los sustitutos de la leche materna, adoptado por la Asamblea Mundial de la Salud en sus Resolución AMS 34.22, Mayo 1981.